

Besättningskort och Behandlingsbevis

- Ringormsvaccination
- Avhorning

Tillstånd/Kontrollista för brandfarliga Heta Arbeten

Djurägare:

Namn..... Adress.....

Telefon..... Mobil nr.....

SEnummer..... Husdjursförening:...Skånesemin.....

Ansvarig veterinär: *Marete Hanssen, Cecilia Danielsson*

Kalv		Vaccination 1		Vaccination 2		Avhorning och signatur Heta Arbeten – se text nedan			
Öron nr	Född datum	Datum	Namn	Datum	Namn	Datum	Smärtlindring	Utförare	Tillståndsansvarig (djurägaren)

Ringormsvaccin (Bovilis Ringvac vet.) injiceras i halsmuskulaturen på höger respektive vänster sida. Dosen är 2 ml vid varje tillfälle. Preparatet har ingen karenstid vid slakt.

Vid avhorning injiceras 2,5 ml/horn med lokalbedövningsmedel Xylocain 20mg/ml (Preparat o styrka) under crista frontalis (benkammen) mittemellan öga och hornanlag. Karenstid slakt 28 dygn mjölk 7 dygn.

För smärtlindring vid avhorning injiceras Loxicom inj. 20mg/ml subkutant. Dosering: 0,5 ml per 20 kg kroppsvikt. Karenstid slakt 15 dygn mjölk 5 dygn

Utförare av avhorning är behörig för heta arbeten och tillståndsgivare ansvarar för att brandvakt finns en timme efter avslutat arbete. Arbetsplatsen är städad och vid behov vattnad samt att brännbart material är avskärmat. Två brandsläckare med minst 6 kg pulver (klass 34A233BC) eller en vattenslang med godtagbart tryck vid munstycket skall vara framdraget till platsen för avhorning. Räddningstjänst/Brandkår kan larmas omedelbart

Kalv		Vaccination 1		Vaccination 2		Avhorning och signatur Heta Arbeten – se text nedan			
Öron nr	Född datum	Datum	Namn	Datum	Namn	Datum	Smärtlindring	Utförare	Tillståndsansvarig

Ringormsvaccin (Bovilis Ringvac vet.) injiceras i halsmuskulaturen på höger respektive vänster sida. Dosen är 2 ml vid varje tillfälle. Preparatet har ingen karenstid vid slakt.

Vid **avhorning** injiceras 2,5 .ml/horn med lokalbedövningsmedel Xylocain 20mg/ml (Preparat o styrka) under crista frontalis (benkammen) mittemellan öga och hornanlag. Karenstid slakt 28 dygn mjölk 7 dygn.

För **smärtlindring** vid avhorning injiceras Loxicom inj. 20mg/ml subkutan. Dosering: 0,5 ml per 20 kg kroppsvikt. Karenstid slakt 15 dygn mjölk 5 dygn

Utförare av avhorning är behörig för heta arbeten och tillståndsgivare ansvarar för att brandvakt finns en timme efter avslutat arbete. Arbetsplatsen är städad och vid behov vattnad samt att brännbart material är avskärmat. Två brandsläckare med minst 6 kg pulver (klass 34A233BC) eller en vattenslang med godtagbart tryck vid munstycket skall vara framdraget till platsen för avhorning. Räddningstjänst/Brandkår kan larmas omedelbart